

| 対象疾患 | レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 単位 | 投与日程 | インターバル 日数 | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 胃 | PTX療法(3投1休) | パクリタキセル注 | 80 mg/m2 | | Day1,Day8,Day15 | 28 | |
| | SOX療法(ホスアプレピタント入り) | エルブラット注 S-1 | 130 mg/m2 | | Day1 内服14日間(Day1夕~Day15朝), 14日休薬 | 21 21 | |
| | XELOX療法(ホスアプレピタント入り) | エルブラット注 カペシタビン(ゼローダ) | 130 mg/m2 1000 mg/m2/回 | | Day1 内服14日間(day1夕~day15朝)7日間休薬 | 21 21 | |
| | アブラキサン療法 | アブラキサン点滴静注用 | 100 mg/m2 | | Day1,Day8,Day15 | 28 | |
| | アブラキサン療法(3週ごと) | アブラキサン点滴静注用 | 260 mg/m2 | | Day1 | 21 | |
| | オブジーボ(NIVO)+SOX療法(ホスアプレピタント入り) | オブジーボ注 エルブラット注 S-1 | 360 mg 130 mg/m2 | | Day1 Day1 内服14日間(Day1夕~Day15朝), 14日休薬 | 21 21 21 | |
| | オブジーボ(NIVO)+XELOX療法(ホスアプレピタント入り) | オブジーボ注 エルブラット注 カペシタビン(ゼローダ) | 360 mg/body 130 mg/m2 1000 mg/m2/回 | | Day1 Day1 内服14日間(day1夕~day15朝)7日間休薬 | 21 21 21 | |
| | オブジーボ(NIVO)療法 2週毎 | オブジーボ注 | 240 mg | | Day1 | 14 | |
| | オブジーボ(NIVO)療法 4週毎 | オブジーボ注 | 480 mg | | Day1 | 28 | |
| | サイラムザ+PTX療法 | サイラムザ点滴静注液 パクリタキセル注 | 8 mg/kg 80 mg/m2 | | Day1,Day15 Day1,Day8,Day15 | 28 28 | |
| | サイラムザ+アブラキサン療法 | サイラムザ点滴静注液 アブラキサン点滴静注用 | 8 mg/kg 100 mg/m2 | | Day1,Day15 Day1,Day8,Day15 | 28 28 | |
| | サイラムザ+ロンサーフ療法 | サイラムザ点滴静注液 TFTD | 8 mg/kg | | Day1,Day15 ①内服5日間(Day1夕~6朝), 2日休薬, 内服5日間(Day8夕~13朝), 16日休薬; ②内服5日間(Day1夕~6朝), 9日休薬, 内服5日間(Day15夕~20朝), 9日休薬 | 28 28 | |
| | サイラムザ療法 | サイラムザ点滴静注液 | 8 mg/kg | | Day1 | 14 | |
| | 大腸 | CPT-11単独療法(ホスアプレピタント入り) | イリノテカン注 | 150 mg/m2 | | Day1 | 14 |
| | | FOLFIRI療法(ホスアプレピタント入り) | アイソボリン注 イリノテカン注 5-FU注(DIV) | 200 mg/m2 150 mg/m2 400 mg/m2 | | Day 1 Day1 Day 1 | 14 14 14 |
| | | | 5-FU注(CIV) | 2400 mg/m2 | | Day 1, 46時間(インフューザーポンプ使用) | 14 |
| | | IRIS療法(ホスアプレピタント入り) | イリノテカン注 S-1 | 100 mg/m2 | | Day1,Day15 内服14日間(Day1夕~Day15朝), 14日休薬 | 28 28 |
| | | アービタックス療法 | アービタックス注射液(初回) アービタックス注射液(2回目以降) | 400 mg/m2 250 mg/m2 | | Day1 Day1 | 7 7 |
| | | アバスチン(BV)+FOLFIRI療法(ホスアプレピタント入り) | アバスチン注 アイソボリン注 イリノテカン注 5-FU注(DIV) | 5 mg/kg 200 mg/m2 150 mg/m2 400 mg/m2 | | Day1 Day1 Day1 Day1 | 14 14 14 14 |
| | | | 5-FU注(CIV) | 2400 mg/m2 | | Day1 | 14 |
| アバスチン(BV)+IRIS療法(ホスアプレピタント入り) | | アバスチン注 イリノテカン注 S-1 | 5 mg/kg 100 mg/m2 | | Day1,Day15 Day1,Day15 内服14日間(Day1夕~Day15朝), 14日休薬 | 28 28 28 | |

| 対象疾患 | レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 単位 | 投与日程 | インターバル 日数 |
|------------|--------------------------------|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------------|--------------|
| | アバステン(BV)+XELOX療法(ホスアプレピタント入り) | アバステン注 | 7.5 mg/kg | | Day1 | 21 |
| | | エルプラット注 | 130 mg/m2 | | Day1 | 21 |
| | | カペシタビン(ゼローダ) | 1000 mg/m2/回 | | 内服14日間(day1夕~day15朝)7日間休薬 | 21 |
| | アバステン(BV)+ロンサーフ療法 | アバステン注 | 5 mg/kg | | Day1,Day15 | 28 |
| | | TFTD | | | 内服5日間(Day1夕~6朝),2日休薬, 内服5日間(Day8夕~13朝),16日休薬 | 28 |
| | | アバステン注 | 5 mg/kg | | Day1,Day15 | 28 |
| | | TFTD | | | 内服5日間(Day1夕~Day6朝),2日間休薬, 内服5日間(Day8夕~Day13朝),16日間休薬 | 28 |
| | サイラムザ+FOLFIRI療法(ホスアプレピタント入り) | サイラムザ点滴静注液 | 8 mg/kg | | Day1 | 14 |
| | | アイソボリン注 | 200 mg/m2 | | Day1 | 14 |
| | | イリノテカン注 | 150 mg/m2 | | Day1 | 14 |
| | | 5-FU注(DIV) | 400 mg/m2 | | Day1 | 14 |
| | | 5-FU注(CIV) | 2400 mg/m2 | | Day1 | 14 |
| ベクティビックス療法 | ベクティビックス点滴静注 | 6 mg/kg | | Day1 | 14 | |
| | ベクティビックス点滴静注 | 6 mg/kg | | Day1 | 14 | |
| 膵臓 | GEM/アブラキサン療法(ホスアプレピタント入り) | アブラキサン点滴静注用 | 125 mg/m2 | | Day1,Day8,Day15 | 28 |
| | | ジェムザール | 1000 mg/m2 | | Day1,Day8,Day15 | 28 |
| | GEM単独療法 | ジェムザール | 1000 mg/m2 | | Day1,Day8,Day15 | 28 |
| | オニバイド+5-FU/I-LV療法(ホスアプレピタント入り) | オニバイド点滴静注 | 70 mg/m2 | | Day1 | 14 |
| 5-FU注 | | 2400 mg/m2 | | Day1 | 14 | |
| クローン病 | レミケード療法 | レミケード点滴静注用 | 5 mg/kg | | 0w,2w,6w,以後8w毎 (最大10mg/kgを8w毎,短縮時:5mg/kgを4w毎) | |
| 小細胞がん | AMR単独療法 | カルセド注 | 40 mg/m2 | | Day1-3 | 21 |